

**DISSERTATIO DE  
INDOLE ET  
CURATIONE  
HYSTERIÆ  
SECUNDUM...**

---

L. Porges



# DISSERTATIO

DE

INDOLE ET CURATIONE HYSTERIÆ

SCRIPTORIS

OPINIONES POSTERIORIUM ELABORATA

AUCTORIS

L. PORGES



PATAVII

IN OFFICINA BOONARDI TITULI MIBENTIA

1843



*Handwritten signature or mark.*

0 21 100 100 100

Das Schicksal der Weiber ist meistens weit trauriger  
als das der Männer.

Druck. Joh. Georg Zimmermann.  
(Erscheinung in der Druckerei.)

§. 1.

**Hysteria**, hoc nomen, est morbus a nervorum classe chronicus, formae admodum variabilis, consistens in alterata sympathiae nervosae sensibilitate, praecipue nervorum abdominalium et sympathicorum.

Hysteria, vox derivata ab aequo utero, proprie morbum utero foeminae designat, et qui cum analogia symptomatibus in utero masculis occurrat, huiusque namque hypochondriacis fuit distinctus; ita, ut hypochondriacis et hysteria idem morbus sit habitus non phaenomena sed utrius individui differentia. Remanens vero, nam quaeque hysterici alioquin esse observatos, hypochondriacis ab hysteria separantur et hystericiam masculinam (postquam nomen inappropriatum) nunciantur. Nihil ipsi quidem luctantur hysterici typicis haereditarias exemplar in paucis quibusdam sanctorum fuit observatum; dum vero hi casus admodum rari sint, ceterorum vero sanctorum hysteria affertur formae, morbum hunc quo foeminae solentem tractandum esse, mihi persuasi.

§. 2.

**Neurographia.** Est idem diversis, sed quo hysteria in conceptionem vocat diversis, et fere casibus relationi posuit morbis, et ita quae maxime videtur ut cum delirio dii tentamen. Revolutionem, percursum et appropinquat sequentibus hanc esse offert imago:

Incipit morbus nris, qui aegre expector, mentationibus, dysphoria quidem, conversionem utrum occupationem difficile reddens, agitationem, remissionem atque adpotentiarum mutationem. Anxie evadit, incerta, mobilis admodum; spernit, quae semper dilexit; colit, quae parvi habuit; desiderat, respicit, despondit, exultat absque causa, character positionis alius sit, immutabilis, in affectibus vehementer praeditus et

anxia levissima. Illa sensim sensimque crebescit exordium par-  
dicalia, anxia, cardiopalmus, dolores in acrobialia, an-  
xia pectoris in pectore; anxia acria, photopsia, paroxys-  
mi subiti, singultus et inaequitas paroxysmorum, qui varie offert  
symptomata, pro variis in quo solent anxia ligat morbos, co-  
gunt.

*Hysteria uterina.* Sensem experienter agnosce, ut si ei ex  
laxa pelvis uterum absterget uterum, pergruam simul cor-  
pus aduenerit, et ad collem pervenit illud costringent...  
globulus hysterici. Differunt circa uterum ejus naturam; alii  
laryngem, alii pharyngem spasmus trahi credunt; liquet vero,  
anxia, dum anxia vocant suffocationis periculum, ut  
fama ruborem laudare adstantes; adstanti utem quam  
maxime, quatenus illis praedictur deplenda.

*Hysteria vesicalis.* Dolor uterum in stranguaria laetissimus,  
que accidit urina, spastica est.

*Hysteria intestinalis.* (Locutionis hystericæ forma). Pectus  
et fœcia ventris tenet et subita contractio; tenet spas-  
mus muscularis uterini, dolores uterum, anxia, laetissimus  
in regione umbilicali; adstantes tenet levissimum, ino-  
mum adpropinquantes absterret, illique non solum constringit  
sed claudis quoque, ut morbos claudis adstanti (quod  
pro nervis deponit anxia); fœcia et fœcia pectus  
vix intelligitur vel cunctis dolores. Accordat ventris et diar-  
rhœa, fœcia ventris nulla, pelvis uterum anxia parva, in-  
gularia, anxia et uterum spastica.

*Hysteria gastrica.* Graviditas et aetate pectus po-  
liticalia hystericæ forma. Sensem ventriculi costringit, anxia,  
quatenus non videt, ut in hysteria intestinali anxia erga  
adstantes. Spasmus uterum uterum propagatur et subit  
vixit fœcia clari, pallidi, insipidi, si ventriculi uterum  
modo torquet; anxia vel anxia, si ventriculi quoque anxia  
plexum.

*Hysteria pulmonalis.* Dyspnoea anxia, dolores uterum  
anxia, pectus, inspiracionem intercipientes, respiracionis  
impedientes, suffocationis laudare anxia periculum,

idque larga copia videretur. Tunc itaque aliam, latram, respiratio esse abdominalis, non subcostalis, acria, cito accendit.

*Hysteria laryngea.* Respiratio stibillans, acria, totius colli commotio, vox manifeste elicta, tonsilae laevae, interdum peritae animalis, loquela atque motata.

*Hysteria cordium.* Cardiopalmus repetendus et adeo vehementer, ut non solum sentitur, sed et audietur, imo videtur; vehementer pericardio oppresso et hypochondro, ventibus manibus interdum laevis.

*Hysteria spinalis.* Terribilis forma, non citra. Dolor trivisus juxta longitudinalem columnam vertebralem, de repente rigiditas et immobilitas completa, ita ut nec membra nec membra moveri possit — Tetanus hystericus; vel (quae saepius occurrit forma) membra posteriora flentiora — Opisthotonus hystericus; in singulis casibus occipit colorem terribilem et alterationem. Sub longiori duratione tunc sunt apertae, et turbatae sanguine motus tam in palmis quam in facie pharyngis manifestatur convulsio.

*Hysteria ophthalmica.* Dolor rheumaticus oculorum juxta radium nervi frontalis et temporalis, non vehementer, non levis — Emigratio, migratio; alia sensus clari vel sili formi caecitate per caput protrahi — clava hysterica.

*Hysteria ventriculi.* Pulsus validus frequens, illi ad instar tenues et duri adeo, ut aegrum synocha flagrantem dicere. Supplicatio vero non tantum altera vasorum ramos corripit, sed etiam subitaneis symptomata; interdum acria abdominalis, caput pulsatile vehementer accendit accendit.

*Hysteria muscularis.* Convulsionem advenit; levissima forma effertur immores, ab ipsis subjectivis, parva subjectiva; voluntati preloso non subtrahunt motus, sunt automatici, non voluntatem deinde ex non coactione procedunt regiones ex. gr. ex antibrachio et hic limitantur; vel super totum systema musculorum protrahunt. Manus sunt rapidi, rari, non manulorum familia alterum sequente. Subinde musculorum, qui nonquam simul agunt, combinantur motus, non horrorem concitant prominentes.

Namque nonnulli omnes tota vehementia laedunt; et ad abiectionem plurium pedem eorum possunt, et quidem tanto impetu, ut ad retinendam individuum aliam debile, hinc inde non nisi ut robori vis efficiant. Tanta debinde cadunt vehementia, et facile omnia franguntur vel laxantur, namque distorquentur, organa mobilia convulsantur. Obsidi mihi tanta omnia posse septendecim annorum, constitutionis hypochondricae, habita tenaci, characteris mitioris. — Cerebralis diaphragmatis vel quae gelasma cum oleo commixta, vel quae lacrymae sparsa cum oleo tragula apparet.

Sed itaque aut spasma musculorum respirandi intermissionem (excepto diaphragmate) integra quodam aspectu manifestat; alia lipothymia nulli vel delirio abiciantur.

### § 3.

Singulae haec periodo ferreus incipit combinantur, vel organa velia una in alteram transiunt, quia hoc statim possit nec combinationis nec successione. Id ubi patet, evolutionem unius alteriusque forma characteri epidemico tum stationario tum annuo respondere, aestate tempore plerumque gastritidem, alio praesens praevaleat hysteriam, gravio epidemico vel gastrico vel inflammatorio pulmocum praevaleat. Tandem interducent omnia haec symptomata, menstruatione laesione, resultant commixta.

### § 4.

Donat paroxysmus in genere plures horas; symptomata vero non semper eodem interdum rigore, cum tota quarta vel quinta calante cessant plus minus clares et convulsiva, consequitur sepius et in aliam vadit convulsionem. Interdum tamen accessus unius plerumque dierum observatur cum intervallis longioribus, sub quibus redit convulsiva, colloquuntur, bilant, edunt sepius. Interdum ergo paroxysmus convulsivis componitur, quorum numerus a singulis aliquot ad quadraginta sine cessante addidit et ultra. Priores accessus plerumque vehementissimi sunt; in uno aegro potuerunt

cto, secundum quadraginta quinque dies cum remissionibus quadraginta vel quinquaginta minorum durasse, est observatum.

Aegrotas in genere optime distinguunt inter remissionem simplicem et bonam paroxysmi; dicunt eorum esse finem, se toto sibi relinquere posse et tuto curari; remissionem quamquam occupant sibi, imo per plures horas protrahunt, tamen moriunt aegrotas, se bene sentire, eorum non esse finem; experiantur certam mentis remissionem, inquietudinem, eripitiam, stuporem, dysphoriam, quae totum praetegit convalescentiam.

Fine paroxysmi alii caribinis stupore et expressione magis gradui, alii lacryis profusa, alii utraque statu aliter atque. Fecit loquax frigidus; occupatur, intensius dolere se percipere in toto corpore; aut lassus, dolens, cohibens; difficile non morari; rader lingua in tota superficie; caput calet, oculi dolent, dentes quasi obstrui, interdum fracti sunt; sensus valde irritabiles, idae confusae et exaltatae; aegrotas impetitosus, tristis, cholericus; urina clava, larga hinc sedes, appetitus nullus, sitis magna, somnus impossibilis vel valde inquietus. Aliquando remittit paroxysmi lacrimis alioque aqua, maculorum vasa, videtur sphaerularem, extremitatum inferiorem, imo convulsio partialis, Chorea St. Viti; interdum post paroxysmum immobilitas vel in intervalla in somnambulismum cadunt, vel in statum comae magnifici; haec ego pariter post comitum in tali statu detentum vidi, quae, quoniam porta strii, aperturam (pluribus quatuordecim tabulis interpositis) dextris se impetu ab urbe vicinis reversionem cognovit, et advenit cum magno gaudio exclamavit. — Si abidem tenet comae pariter paulatim recedit, interdum intra viginti quatuor horas, in alio casibus plures post septimanas. — Habitudo mentis status paulatim revertit, in paroxysmo, et stomachus leviter, post plures dies, et gravior solus.

### §. 5.

In intervalla aegrotas statim sociat secundum paroxysmum ebullientiam et frequentiam. Si rari sunt et morbos recedunt,



sensitiva rigens interitus affectus speciem; nec facile capi potest, quomodo affectus adeo parvis tam inconspicuis in constitutionem exerat affectum. Nihilominus causas fieri aegras sunt nervosae, mobiles, irritabiles, imaginationis vixae, ex causa levissimis contrahendas, impetentes, irascibiles, obstinatas; sensus admodum acutius; hoc quidquam interius, non quidem aut odor cecus, temperatas variatio, atmosphaera electricitate abundans graviter illis afficit; angustia parili-que ardes delatigantes, et capitis dolores occurrunt, sensus raro profundus, continuus; saepe difficilis aut impossibilis, incompletus, sensus humilis turbatus, plerumque sunt melancholicos, solitudinem quaerunt, idcirco tristibus comparant, interdum incidit desideria, aliae hilaes semper sunt, vident stupor sua, vel tristes luctum foveant, haurientia quoque, glandulae hystericae, regulares inspirationes profundiores accedunt, cardiopneumae, acini deliquis, patridia et obitipula clauduntur.

Mentis in genere irregularis, vel, si omni sensu impre-ant, difficilis, brevis, non cephalus, dysphasia, characteris mutationis; vel non pariter regularis quod tempus et quantitas. Conceptio, gestatio et parturitus normale interdum, cephalus sensus abortus. In genere ceteris in hysterica morbo-bose addunt; plerumque fluxus alia laborant; aliae maculas de-ditae palliditasque diurna venantur.

Proclivis in hysterica phaeopomosa est in modum et frendem disposita, quae non in variis dignetur morbum, quo amulibus, quibusque in commercio variat, solum vel et mutatae non idem impetire sententia; sedque non solum perire, quo proclivis, solent et proclivis sententia sacrificando, sed etiam directe maxime sollicitudine arduendo mutationem; hoc deinde modo accipi potest, quomodo alia sensus angustia inquit, aliae alio modo miserieculis excludas admittant.

### §. 5.

Omnis haec symptomata rigore incrementis, quo frequen-  
taria et quidem per longum tempus recurrenti paroxysmi. At-

gras adpeditas mentis aciem perdit, corpus spiritibus et nervis intra periculisque versatur. Tandem marces, et jam per aliquot annos duravit, secundum dispositionem individuum plus minusve profunda reliquit vestigia. Intellectus, princeps memoria linguæ, conpervitur aegre de corporis capite debilitate, et imbecillitate intellectus timet; nunquam manifestum cuius corporis lateris, vel imo totius systematis muscularis adeo decrevit; alia auditus plus minusve completa est vires debilitas, hinc scilicet melancholia, proposita in syncope incompleta, species claudicationis cum suppressione loquæ et coarctata pro parte audita, non raro paralyti valde et acriorem inde retractio. Non claudicatio vero paralyti, digestio difficili etc. nutritio neque viget, adeo color non est duratus et regno puerorum aciem arguere et alacriter perficiant.

### § 7.

*Diagnosis.* Tunc vehementia quam complicatio symptomatum multum facit ad malum perturbandum et a recta via salvandum. Adhuc vero diagnosis, que medico attento non affertur, aut partem prout hystericis characteribus, partem speciem singulis casibus hinc hinc considerat.

*Prædictis notanda:*

1. Peculiaritas valde, in aegris acie potissimum querenda, acie in alia fructu, hystericis, alpetre, languente in alia.

2. Symptomatum reversibilis et incoarctata, hinc e diuturno alii oppositorum hinc lade nervosus incoarctata.

3. Contrarius symptomatum coarctata, ut palus domus, tonus choreæ alii caloris duratione, choreæ alii.

4. Abscissa organi spiritus corrupti in potissimum exteriori rectis; sic e. g. submaxillares nervi palpitantes nonnunquam sine colore videmus.

Specilla nervi, et sic dicunt, locale phænomenon pharyngeum inflammationis referunt speciem, vel quod vehementius, hinc in arteriis coarctata.

Inflammationis vero diagnosi repugnans phenomenon systematice naturae eorum febris idonea refutantis; ut: abscessus febrilis aut alicui deliquit progressi, neque ex alia; temperatura cuius siquis pulsus esse normalis esse abnormis; repositum morbi acutia, acutia et lenta; porro exploratio organi percipitur dolentia; contractio aut firma luxuria, abdominalis, quam quidem palpore ab initio abhorrenti aegras, deinde vero cum magna ferocia lumenque percussio in cordis, percussio et auscultatio in pulmonibus, materiam vomitu aut diarrhoea excrementorum inquisitio, urina tandem spastica.

In aliis casibus, quod talis accensus iam prius aut nequius afficeret una cum alicuius generis debili confirmatione diagnosis. Anxiosum affectu vero eorum tactum fidem habent medicum, quoniam facile comprehensum obsequia.

#### §. 8.

Deorum est latus, chronicus, variatus aetate, proinde ab solvendo paroxysma. Dant hysteris per aetate, atque serie paroxysmorum compositor, in quibus nil typici esse offert, si casibus, quod ab initio latus interdum transiens periodus. Singulis paroxysmis variis accipit tempus a quadrante horae ad quatuordecim usque, et latus interdum provocatur cum, uti aut frigida, potu frigido, ertis odore, cum etc.; alios casibus tandem sunt aegras, ut vel subitane alicui commotio electricum quasi producat latus, a cyclore in pelvis usque rursus atque strum vel commotum dolorem.

#### §. 9.

Ex sententia eorum, uti in casibus affectionibus chronicis, variatis et complicationibus chronicis, neque per se ipsas latus place nihil prodest. Nam vel auctor hysteris, vel morbo accidentali atque affectione, quae interdum paroxysmos atque proinde eorum tollit, vel tandem alicui afficiatur hysteris, quae iam immixta hysteris affectus esse possunt, nunquam vero hysteris ipsa. Et quod difficultatem alicui latus aliam, aegras longam vixit possunt

vitam, raro vero licet cum stricte observata et illam vicissitudinem sequi, quibus exponatur. Autem quibus intererunt alterationes utri et utriusque, mentalis alimentaria, organica respiratoria, cerebri, secundum naturam, quam hystericis tribuimus solam, quod satis probat eorum inspectionem ab idem praecipue fuisse directas.

### §. 10.

Aetiology. Quatuor duntaxat rationes opinionem deca solam hystericam. Secundum antiquissimam hystericam qua affectio utri consideratur; secundum alteram in variis radicatur vicissitudinem, ut in abstinencia, in potere vel in cibus; secundum tertiam in systemate nervoso universali, secundum aliquam in nervo particulari.

Hippocrates utrum comparavit cum ceto, cum et nota praedixit quod ad varias corporis partes se convertere et variis illis afficere possit male, quas nunciat per osque ventres gratas, utrum ad locum suum revertentes essent laetitia. — Eandem ferebat etiam medicos opiniones, qui in utero, quasi in facie vapores malignos subdistingueret et per totum variis penetrando singula organa invadere et lacessere credebant. Vaporibus istis tandem globum mysteriorum subdistingueret, quem ex utero oriundum videmus, thoracem et tracheam pervadere, ascendere, descendere, respiracionem impedire, laryngem constringere, convulsiones et febriles intellectuales lumbos afficere affirmavit.

Nostri quoque longe melius parte in abstinencia utri vita ponant causam hystericam atque experientiam suam opinionem sufficiens rationem.

1. Hystericam utrumque in praesentia ante pubertatem.
2. Cum gravitate et parte inter laetitia.
3. Extinguitur plerumque morbus cum quinquagesimo, quem vita sexualis extinguunt.
4. Sentientes alterationem utri et utriusque sublevis.

Alii in viciis sanguinis praedictis et mentali et organica abstinencia et praecipue utrumque affecta quatuor

notam, atque Grigori adolescentem genii epidemici crassi aetate 1835-1836 in hysteriam lapsurum crassi est omnes.

### §. 11.

Antea vero sequentes ateri ad hysteriam statuit rationem.

1. Generalia morbos systematis nervosi symptomata, quarum complexus hysteriam designare solemus, incipere solent, quia organa affectu ateri vel ejus vitiis turba solent ateri possit.

2. Hysteria plerumque vel abire hunc alicuiusmodi origines debet vel constitutionem; hic imprimis sensibiles nervorum topice alicubi est commemoranda, quae incipiens simul cum ateri inflammatione incipit, haec et hysteria in aliis casibus mere nervosa, in aliis constituta sit et symptomata.

3. Substratum mere nervosi hysteriam praecursum, functiones ateri turbare, et organa haec ad alterationem disponere possunt, quae tunc in hysteria nervorum reserui, et accensus hysteriae provocant, mere symptomata.

4. Experientia docet, quomodo gradus affectionis ateri morbosae ad gradum et vehementiam praecursorum hysteriarum nequaquam in directa esse habent proportionem.

Illud solum superius addere, quod forte videri datur in occurrence huiusmodi organo, cujus alterationes organica causales cum hysteria necesse minus frequenter manifestant, ac utrum et curia; quoniam passim datur vetulus, quorum uterus alicuiusmodi non efficit, quia hysteria liberamur; quoniam rarer, polypus ateri, hydrops ovariorum uterumque placentia praevenerunt hysteriam. E contrario experientia quotidiana compertum habemus, quod in hysterica functiones ateri, fluxus menstrui, gestatio et partes pariter regulares esse possint; neque vero ipse nequaquam utrumque quae aetate ateri accensum. — Omnia denique ateri symptomata, quae ad systema genitalis referantur, ex irritatione nervosa, qui illi praecursum, plerumque praedant; sed symptomata neque organica in ateri alicui systema longum habent gradum subiecta; ut in tale incipit.

nali, in ventriculo, in pulmonibus, in corde, in diaphragmate etc; una cum altera predominanter affectio; longa decurrunt intervalle, in quibus omnia normaliter funguntur, de repente turbæ in parte longe alia systematic gangliosa oriantur; diapoda vero rictus integre remanet.

### §. 12.

Hypnot paralytica circulationis in corde et pulmonibus impedimenta effici solet, atque eo modo dyspnoeam, animi deliquia, intestinum per diaphragma compressionem et glihi hysterici sensationem provocari. — Bydetham in alcerum spirituum animalium motu; Potome in systemate nervorum, Lepois in idiopathia cerebri, Willis vero cerebri et nervorum affectione radicari hystericum asserunt.

Ut reliquis exponebam, recentissimum adhuc commentum ferat, quod de proxima hystericæ causæ conceperunt Deleis et epigius Bucerotati spirituum. Sectionibus similium lental la vasculata angustula prævalente latere factam contendunt, quæ parietes venarum, alium dexas ventris et viscerum periclyptatis uteri mollescat, ganglia vero et nervi gangliarum demoveant.

### §. 13.

Non vero quædam proximam in illa arguo revidere credimus, ex quo influxus in cerebra reliqua cernat organa, nempe in cerebri. Supponimus aliterum, ganglia nervorum inferiorum, centro vel polo laterali in cerebro pendere et ex his ipsa actitate alcerum in ganglia omnia hystericæ symptomata in singulis organis commoveri. Quæ sit hæc cerebri pars, quallæ ipsa alteratis, plene ignoramus. Id autem assequi licet, causam rationem pathologicam huius non invenire et commutationem poterum esse conjunctam, ita ut negativum sit positivum et clausura, omnia enim nervorum actio est poteris; et hæc demum ratione locum receptivitas et reactio sunt explicanda.

In cerebri vero potius quam in nervis receptivitas hæreticæ

morbus se facillime occidit, qui secum repetitur, quod maxima corporum pars, vehementibus licet paroxysmis trahita, vita vegetativa integra gaudet, licet laetabili et vigore habitus in intervallis; quod communis hystericae per annos protrahitae sequela sit laesurae intellectus, animae et motuum voluntariorum; quod hysterici interdum cum epilepsia vel cataplexia complentur; quod rursus cathartici neque adhibitos menses alio et moribus remedia interdum avertunt morbum, et quod denique transitus phasmarum ex aphaera vegetativa in systema muscularum voluntariorum alio modo nequaquam explicari possit.

### §. 14.

Dispositivis momenti sunt:

1. Ceteris corporis aeternitas et potestas, ante quam ingressi non adest. Hoc phaenomenon non ex evolutione explicandum, quae tam post potestatem, quam in individuo hysterica interdum progreditur; neque ex certo solni cultus gradu, dum mulieres quoque rudes, licet ex infima sublimis plebe hysterici laborent, sed potius ex propria infirmitate incuria (necesse) repetendum est, quae gravis, quae ceteri vita, animae fructus atrophiat.

2. Ceteris phasmarum vigor; licet homines cum exigua facultate reproductiva, homines quidem, illius nunquam hoc morbo laborant.

3. Hereditas. Hysteria corporis per familias et generationes propagatur.

### §. 15.

Causis excitantibus ednumeranda: 1. Ovis, quae vitam systematis vasorum labeficiunt et eodem ratione systematis nervorum intendunt excitantem; ut diarrhoeas protrahit, haemorrhagias fortes normales vel habituales; jactura humorum ad quorum restorationemque magnae impediuntur sanguinis copiae. Inde conceptionibus et partibus orbibus brevi tempore sine multiplicatione, abortu frequente, lectione protrahit plurimum irritatur hic morbus.

2. Jacta major phasmarum vincula. Si longum negotium

merent, quod attentionem non requirit, nihil obest quia vividissime scripserunt insipidius. Illos quae tenent feminas magis obscuras sunt hystericae, ut quae eos pigrescit, laesit etc. Nobiles possunt amorem et amorem, quod tamen nequequam confitentur; solotypia, laetitia, oculi morantur. Nuptiae vero, a conjugio neglectas tanta molitur consilia ejus amorem revocandi, amorem tris et periculis parandi, neque similiter sensu insolvendi etc.

3. Animi affectus deplorentes: spes discepta, cura, amorem, angustia, moror, terror. — Terror cum subita expostione fluxus menstrui praesentis vel imminutis est frequentissima hysterica causa.

4. Omnia, quae directa stimulant systema ganglionum et systema genitalium speciatim, sive tonica sit irritatio, uti coitus frequentes absque conceptione, masturbatio, hincobus protrusa; vel stimulae prope genitalia e. g. ascarides in intestinis recte — sive psychica ut libri lubrici, insipidus, collapsus etc.; hinc hysteria tam alacris quam infirmis claudis corrigit individua.

5. Tandem per metamorphosin ex alia nervosa e. g. typha vel febre intermittente evadit.

### §. 16.

Prognosis catenae tantum fuita esse potest, quatenus in aperienda hysteria raro pericula minatur vitae; haec exceptiviter pro aliis morbis imminuitur; de la genere a malis epidemicis tamen immunda. Salvis vero constitutione integra raro et generalis neque a natura neque ab arte epetenda.

Facillime veniunt quae in pueritia oriantur formae, si cum menstruum disceptationibus coincident. Pueritia vero aetas est: haec illud, in periodo involutivis evadit, coque paroxysmi brevi tempore solvant, vehementer sunt, erque occupant ad vitam absolute necessaria, vel in inflammatione obnoxia vel aetate transiunt. Facillime vincitur quae revera, distinctas causas externas insequens, post paroxysmos vehementes vestigia non relinquit, hysteria. Boni exp-



rii est, si paroxysmi post longiora intervalla postteritum breviora et minores infrequentius recurrant; tandem paroxysmi evadunt.

-Crisis nonnunquam sunt fluxus menstruum revivens, haemorrhoidum vel arterialis, vocinae, diarrhoea, urinae aquosa vel lacrymae profusae, vix interdum agris solutae. Morbos vero amentationes criticae non manifestat.

Transit hystericus in inflammationes acutas vel chronicas, uti gastritidem, enteritidem, gastritidem lentam et inde in ulcercum; per irritationem uteri, per fluxum album protrusum in acutum uteri; per vocinam in tubum degens; ex bronchitide vulplogica in pleuritidem vel febrem hecticae. Tubercula, quibus supervenit hystericus, magis evadunt, et mortem accelerant. Aliis obit in paralytem variam, in comam hallucinam, epilepsiam, synchondriam, melancholiam etc.

Mors incipitur vel ex paralyti organorum ad vitam essentialium sub insula, uti asphyxia, apoplexia; vel per contusionem, vel alios morbos posthumos supra laudatos.

Notandum est, quod plerumque asphyxiae acutae in hystericis occurrant, atque hinc vitam cadentem aequali intensitate patetentis ventigis alii repellenda.

Hystericus aegri non modo vitam periculi expost, et vix per se ipsam, tamen per morbos secundarios periculis minatur. Ceterum aliam rationem attingunt aetiam et morbi lentius est malum ex vita tot incommodis et doloribus indurata, sub constanti cura, anxietate et agitatione transacta.

### §. 17.

Therapia. Jure merito lapsi Lydici medicorum vocatur hic morbus. Exigunt aegri attentionem et sympathiam gradum, difficillime in plerisque casibus concutendum; cum nonnulli medicos cum repellant et aliam avertant. Magna remediorum praedilectione non obstante nec ullum ad certum avertit; quodlibet conficitur quidpiam avertit, quod hic non avertit, quod hinc non avertit. — Prima diebus curae medicae miracula efficit et ad sidere usque evadit

lucibus, et post hebdomadam eo alius ruit. Si consilio, quae referunt, pariter audiamus et illis solum altum ad speciem habemus, subito perdimus fiduciam; bene enim sciunt, se mentiri et decipiant medicum, qui adeo facili negotio deripi potest; qui relata non curant, eo aegros dicunt medicos. Unicum, quod nobis praesto est reliquum, est, ut per nos efficitur ipsa adeo implicandi, ut sibi contradicant et deinde graviter eis respondendi; hac tantum ratione veram fiduciam nobis comparabimus et respectum.

Semper aliquid praescribere opus est, et remedii effectum praedictum. Ille poenula effectus plerumque ingruit, nam aegres persuasum sibi habent, cum venenarie ingruere debere, et ne ratione perveniant, quod alias nequaquam pervenissent. Per hoc omnes aegrotas formales medicas student, percellant de remedio et de statu suo consulant opinionem, quam nec probari volunt, nec refutari, et ex medici effatu rationis interitus derident, quam maxime confutantes. Quam maxime subitanea conditio feminae hoc morbo laborant, magno opus est consilio, ne naufragium faciamus; imo interdum medicos, quem testimentum et tunc, agunt atque illum praediligunt, quem facillime decipere solent. Si consideremus, quod illi morbo individua tam altissime quam infime nigrae sint obnoxia, patet, quod nullas dediderit profundius naturae baratae studium, et hic morbus.

### §. 18.

Secedit therapia hujus morbi in radicalem, quae in causam proximam et palliativam, quae contra symptoma morbi est dirigenda. Palliativa contra regulam generales hic morbo majore momenti sunt; radicales tales non habet, hoc amplissime nequaquam concedit, symptoma vero momentaneum interdum potest auxiliari; ita, ut palliativa horum tenent principalem et a radicali causae schemate regatur, quatenus enim illud videt, quod idem curae medicae repugnet.

Primum vero in singulis indicationem inquiremus, quidem de regulae dieteticae erant praescribenda, quod eo ma-

giæ naturæ meritis attentionem, quæ longe cupidinibus per evolucionem culturæ mentis, per vias dieteticas et convalescentes præter positur his moribus; certe vero non palliativum nec radicale effluendum erit levamen, quando erroris illi dietetici et præter illas sequentibus non erit emendatus. Eodem ergo tempore regimen dieteticum prophylacticum atque ac radicalem incipit indicationem.

### §. 19.

Males vero convalescentes et errores dietetici multo facilius investigandi sunt, quam abolendi. Plurimum equitatis et clem. indulget; plane nihil agui et nullo pretexto probant, ut nihil agere possit; curis autem modicis condido prius est occupatis; qui illis necessitatibus prædicant, aliam promissam obtineret, et si plane nihil impetrandum. Malandum ergo ut non sponte laborare incipiant; ad artis maxime, picturæ, scientiæ naturalis studium incumbant, quod neque attentionem requirit ac leviter cupidinem interdum alienat; aliis conditionibus aliud negotium.

Aliam prædictam ingria his malis adolescenti ut leuaturæ nisi sexuali satisfaciendi modus; plurimas causas evocant et diuinos alios accusant; cæcet sibi condicio a fronde, sed causas quoque sit in detegendo hæc vitio et parcam agram, si detenerit; hæc proinde modo confidentiam ejus et sympathiam sibi comparabit et recedentes ipsi largus remedium psychicozum genus. — Ex hæc prole vitio suo concipiant hystericas, et si concipiant, raro materant. — Si fieri possit, nisi sexuali modo naturali satietat; in cura contraria res quam maxime ardua. Negatives aliquid defatigant, exercitium corporis, levis contentio, cura quædam, occupatio mentis etc. optima præstantur remedia; cæterum in lecto non decumbat, nisi defatigata et amandata, neque in lecto maneat non dormiens.

### §. 20.

Valde irregularis esse convalescenti hystericas quædam dietam sensu strictiori; nam per plures dies plane nihil con-

ducti, et vitriolicum aqua et potu Chamaemilla replent, necesse est nocta profunda ora, pictura, casum etc. largi quantitate ingerantur. Diæta vero sit riguerissima, nutritiva potius quam stimulans; mane potus succolatus, ad prandium jura carnis bona, cura rectior, nullum leguminosum, nec herbas; pro potu coarctatis levis multa melle et panco lupuli præparata, acido cathartico diuisa, vel aqua cum panillo vini. Contra consummationem ad horam matutina vel vespertina, nec leuiter antequam decumbat aqua, ne symptomata reuerentia, postea exacerbantia ingruant nocte.

Alia in præca tarda, facies dura, manichææ maculae intestini crudi peritiu morant. Aggra vix multum coarctantur ad expellendum hoc malum per remedia varia in eum vocatis; alia largis arctioribus tæteri, cæteris purgationibus præcipuas uti velle avari quantitatibus vitriolicam et tibiæ intestinalem irritant et ceruicem vim assimilatoriam labefactant; alia cum lotulinæ rectum per chymum Kaseyli vel alia naturæ humane alimentum hauriunt, et leuiter eo perueniunt, ut secretione manducante morosa jam ad incum redactam pericula antequant. — Novi ego familiam hysterica tripliciter dæmonia sanctorum, constitutione firma et rigore animi esse commota pandentem, quæ per cholericam pilularum Moricani usum, deui incrementa per longius tempus prostratum de repente in diarrhoeam collapsivam vult et letum cito deinde illis animam exhaust. Magna horum pilularum quantitas post mortem eam lactata mihi, ubique horum remediis et vixi futuro distributa.

Quotiesque difficile sit, tamen hæc aggra remediis specificis innocuis assuescere oportet, e. g. mane vel vespertine jeiuna, hæc pro potu, hæc huius vel jurelis lactis vespere.

#### §. 22.

Principia hanc omnis therapie constitutentia vixi:

1. Abstinentia ab omni remedio, quod vitam phlegmaticam excipiens labefaciat.

2. *Immediatus abiectis systematis gangliosis, irritabilis.* Exiit jam duplex proficietur cautela via: altera palliativa, quae singulorum gangliorum irritationem mitigare vel aliter ejus affectum tollere conatur, illa immediata adgrediens corpus, in quibus accitit morbus, seu cunctis causis phenomenon vel phenomena ipsa; — radicalis altera in morbosam cerebri activitatem agendo, causas irritabilis gangliorum tollendas studet.

### §. 12.

Causa radicalis. Morbosam cerebri activitatem vel ex abjecta sensibilitate vel vegetations proficit, vel demum ex vitata proportionis aetate. Pathologia eandem causam progressus, ut in singulis cerebri organis sedes morbi et abjectiois modus demonstrari possit, ex altera parte vero nequaquam totum est, quia cerebri partem et quomodo singula efficiat pharmaca; de directa indicatione ergo nequaquam sermo esse potest. In nostro casu, ut sensibilitatem cerebri abnormem concupiscimus, stimuli psychici erant regulandi; remedia oculorum liberorum phantasiae inflammatorias, penitus ex ratione, quae hucusque exilari concurrebat; crisiis cunctis causis analitici psychici, paralytici, nutritivi occupasse, interdum avari felix fuerat. Vidi postea 17 annorum quidam placidi, constitutionis lymphatici, vel robustae, hysterici ac haecreditate laborantem vehementissimè corrigi insubitus sub forma singulata, et convulsionem. Frustrata erant per dies annos medicorum clarissimorum consilia, quae mentes acutissimae hysterici evanuerunt et postea hilari aetate et salute locumtanta gauderet. Sed mensibus post in recidivum incidit et vehementius ac prius vexabatur. Quae fuit causa mirabilis? Amorem in medicum concepit; notum vero non fuit propitium — quod ego + matrimonio abinde ingruit lenimen, inflexum psychice potius ac somatice debetur.

Vegetale cerebri principis remanens quietum et unum requirit; causa remota, quae illam impellunt, cunctis in rationem revocanda, quae illam expellunt. Summi hic sunt momenti deliquitio et nutritio inflexum.

## §. 13.

In methodo palliativa observanda videntur: gradus morbi, pars systematis gangliarum minime affecta, quæ sit hæc affectio et quantum faciat ad impediendum curam radicalem.

Quando symptomata morbum in singulis systematis gangliarum parte non emittunt, remedia quidem palliativa nequaquam apta sunt; segriorem vero impedienda ea erigit. Ad remedia ergo confugiendum erit, utentem evolutioni cedentes et fortiter in sensibilitatem agendo apta. Illis scopo propriis balnea tepida respondent; totam cutem irritant, promoveant inspirationem, sensibilitatem contra atmospheram vicinissimam immittunt, etque per stimulos universales et validos in nervos spinales redeunt systema gangliarum. — Acia foetida quoque commendari meretur. Inciderunt segri remedia aliquod fortiter apta in totum systema sensiferum, non facile invenies alios huius sui correspondentes; laudabili insuper potest ei, non singulam ganglion morbum sed omnia simul allevandi et hinc probabiliter repetenda magna, quæ illi adscribitur, cerebrum et membris relevandi virtus. Omnia prout simul laeset systemata obque alio collecta imperta.

## §. 14.

Illic est locus pariter de citro commemorandi, cujus fere semper plura citra observata sunt fueruntque et quidem effectum tantæ dignitatis in morbum curare vixit sunt, ut ab antiquissimis ad nostras usque tempora maxime medicorum pars in citro morbi locum quæreret. Hæc observata sunt:

1. Menstruatio parva, post intervalla debita majore ingruens et prædictam intolerabilem relinquens in podalio, quem fieri potest segrius. Convulsant balnea tepida, Alui et alia cathartica irritationem tollentia et sensibiles uberiores efficiunt.

2. Menstruatio profusa, quæ nequius adeo et diffidius sanatur. Sub menstruæ protracta cum intervalla erigis, cum dulcorum et spemis omnis generis nullam perducit sangui-

non. In genere unde fieri preputia quæ ferunt in intervallo fluxus preputanda. Principales ubi erant ludæm Carbons Ferri, deinde Mercurii Ferri antiseptica, sub menstruatione adhiberi fluxum augent. — Interdum Ferrum nequaquam facit et fluxum menstruum subito cit; contingit in illis, quarum organa sexualia aliam semper sunt et calida. His rebus preputatoria non instituenda. Inchoamus cum repetibilibus, Ferrum quoddam affectum similibus, cum Tinctura aliorum; ab his ad Ferrum preputata ab initio mittere, deinde fortiter progrediemur, a Sulphure et Tinctura aliorum ad Oxydum et Limburum Ferri; quas tunc semper cum remediis aromaticis et amaris erunt coniungenda.

3. Subinde dolores, debilitas, convulsiones ingruentem concubitatione menstruationem; similibus remediis maxime organorum sexualium adacta culpa fert, cui concubitus per uiam Clitoris interuenit et Cataplasmata Clitoris. Etiam etiam organorum preputia unde altiusque ovariis similia affectu symptomata, quod ex dolore locali inter symphyse pubis et cruribus omnia huiusmodi disponitur; interstitia deperitionis periculis hirsutibus vel iunctis ex glacie loco dolenti adhibitis ut accedamus.

4. Membrum interius vaginæ, seu sphærum sub utero attactu doli, rubet et uero tunc obducitur. Nisi ab infectione syphilitica preuenit (quod non ex qualitate secreti cognoscitur), si membra hysterice symptomata est, injectiones ex Infuso Cœli et Saccharo Saturi ferunt. Accidit in vaginæ injectionibus cura. Ol. Hyacinthi tota accenditur.

5. Fluxus albus. Si vaginæ est labiosa, adstringentia erunt profutura.

6. Concipiunt quidem, sed tertio plurimum rebus obortum faciunt. Ab omni cura et preputia ab omni curant seque.

#### §. 21.

Singuli accensus maxime subito ingruunt; seque ipse plene per dies tollunt, paroxysmum adpropinquare. Hoc foret momentum paroxysmum praecavendi et maxime strage-

hædi; sed ex una parte causam morbi in plurimis casibus ignorant, ex altera vero, si jam cognoscimus causam tollendam impare auctor; sunt qui in hac periodo longè propiuscunt Chinæ duci; alii balnea sulfurea credunt non modo paroxysmo præcavendo sed et morbo curando; non vero singulos expectandos esse paroxysmos et omnes tractandos cœcamente.

Si vero morbus jam unam alteram systematis gangliarum partem adgressus sit, atque paroxysmi manifesti celebraverint, quas retinendas sunt indicationes:

1. Transitus in aliam graviorem impediatur morbum.

2. Remedia adhibeantur, quæ systema nervosum irritant, hæc enim voluente sedatis sunt organa hysterica. Agunt potius systema vasorum irritando ac systema nervorum placando; cura ergo manus sunt propinqua, ac non inefficacia vel ino remota evadent. Sic Inf. Chamom. et Valer. ab initio cito adhibet levamen; una vero protrecto vel jure fortiori max effectum prædit, uno peculiaris quædam capitis affectu, quasi intusento, remedio debita in aures vocit atque cum Camphore et Inf. Coffine concentrata est delibanda.

### §. 28.

Hysteria uterina Curanda sibi expetit et remedia illa similia, sibi: Tinct. vel Pulv. Castorei, ex Camomilla; Assum. fort. in pil. et tinct. Efficacissimus in hysteria præcipue uterina remedium alibi Pulsilla, præcipue si cum paroxysmationibus, vehementibus symptomatibus uterina affligitur lædit. Ratio. Puls. nempe recitat ut parandum, minus efficaciam reme sufficit. Dosis Pulsillas eo efficacior, quo minor; inde ab  $\frac{1}{16}$  gr. d. d. incipimus ad  $\frac{1}{8}$  vel  $\frac{1}{4}$  gr. p. d. reducendum, Assum. fort. et Castor. ad  $\frac{1}{8}$  —  $\frac{1}{4}$  gr. p. d. propinquanda.

In hysteria vesicali speciosius ac et Cauterizatio; Tinctore gutta rax in vehiculo mucoso in sex-cto horis, balneo situm tepida et, si nullum curare et effectum, applicatio catheteris.



*Hysteria intestinalis* Gummata ferulacea indicat, Amm. foet., Comari pulv.; potius sub forma clysteris quam interne; insuper abdomen cum Ung. roselli vel Liq. C. C. muricato vel fœcibus aromatico-oleosis tractandum.

Interdum profecto ubi obstitio et fœcus in intestinis esse accumulatio dyspeptica et inconstituta symptomata quædam nervosa præcedunt. Incredibile verum, quæ fœcum induratum membra sublevis in hysteriis irruerunt. Alvas quidem evacuanda, non vero colicula; inclinando potius est secretio in intestinalia alia per dysentia impostura, per unam internam Kali tart. vel Tart. entron. cum Extr. Tarax. in aqua Chamœdilis soluti; aliquæ tandem medæ. Ol. sem. Bie. desideratum habent effectum.

In hysteria puerilis commendanter solent Amm. foet. Castor., Valer. in volutella vinosa et cum Napha juncta; impetum vero locum tenet Opium, parvum Acon. Morphi. Si abdomen organorum digestionem videtur esse, propius Liq. Kali rubicarb. vel aculei cancrum, Magnesium etc. simul vel alternatim cum prioribus. Extremis dispendios ad anodiolum cordis, Emplastrum aromaticum ac Eleghere, ferias, Ol. Cerei et parvillo Turbidentissimæ.

*Hysteria pulmonalis* requirit Scillas forma Emulsi vel Anati cum cum Comari succosione et similibus, nervos pulmonum stimulantibus. Extremis dispendios fortis ad decoctiones cerei pneumogastri.

In *Hysteria cordis* (forma trepidilla) minimæ Scillas decoctæ ʒss — ʒss gr. semel bis d. d. sunt indicatæ; si effectus ineptus, per 3-4 dies repetatur.

*Laryngismus irritatio* cutanea, si nuppi nuppi subito tollunt cum horrendis symptomatibus suis in argenti hypoderm.

*Hysteria spinalis* forma æque tremenda, præter symptomata gangliis irritationem aliquantulum Amm. foetiles, interne Acid. hydricæ. Quæ quidquam fortiori ad acc. semis (remedum Vanquedii parati) in 5-6 unc. emulsionis mucosæ tractatur. Nisi cito remediis spem ad satisfactionem et psychotriam progrediendum erit, præcipue in totius hysteriæ.

In hystericis cephalica substantias vegetabiles, oleo acerbis saturatas conducunt; Inquitia Valeriana, oleo Chamomilla, qua Infusum, Elaeosmicharum vel Tincturae duci admodum restricta, vel etiam qua aromata. Dantur pendularia hystericis aromata; omnia odor induridico tunc grates male afficit hystericis, hinc convulsiones interdum preveant; at odor rosea, leucodulae, jessimi. Apud nationes in quibus hystericia valde frequens est, talia inde aromata a hominibus prescripta sunt. Dantur puriditate et tali parte morbosam hanc irritabilitatem non raro ad hebilesque usque exaltatur convulsiones. In quatuor factum prout, quod omnia aromata hystericis habentur granulata, odor contra crilem vel pluviam ambulantem, vel sanguinolentiam theophrastice cum sanguis et ovis capri et tunc equi nequibus verum illis praestant voluptatem. Aromatibus pro hystericis erga laetantur. Anemone lipida cum Oleo pyrolaeae v. g. Anemone pyrolaeae, naturae vegetabiles nidulatae v. g. talisio Belladonnae, Anemidi, Inquitia omnia pluviam odore mucido gustantes. Odore pro momento tantum et parte duci applicentur.

In convulsione epileptica acida cum Symp. vini; v. g. Acid. Halberi, Effluvia citriol. Myricidii.

In musculari chorea analogus est cum illa cephalica et intestinali; Genuata in dynamo, interius parvae Curatui vel Tincturae Valer. dose et aromata in hystericis cephalica laudata.

Palliativa remedia etiam adhibuerant odorem Acori Soc. et dynamo ex aqua frigida, quod subito citare praestant in cultum.

In casibus omnia remedia hystericis methodos oderunt. hinc inde per laudabili inveniunt effectus, ut adaperio plaga per totiusque apertae cum pulvere Sacro Arctico.

Interdum transpiratione pedum, sub axilla vel ad genitalia, impetigines quoque ante peroxysmum evanescunt, juxta applicatio Kali caust., adaperio Cort. Menorei, alia parvae Sulfuris dose vel balneo sulfuris.

Centurum medicamentorum forma sapienter est mutanda.

## § 27.

Si parvitas jam per prodromos indicatur, praesto sint homines, qui auxilium ferre vult. Sub convulsionibus agrotas contineri debent, ne in aliam partem et recidant, nec mordant, crines evellant, caput commoveant etc. Asperitas et minus deflexae sunt post paroxysmum, quoniam minus collabiti fuerunt motus; hinc non impellatur, quominus flexant membra et extendant, et vires perficiant motus. Facient statilia, praecipua quae colicam, thersicam vel abdomen contriangant et in lectum ponant. Ut contineretur, aliter assistens manum suam incombibi humero, altera tenet pagnum; aliter idem fecit in latere opposito; den aliter dirigant pelvici et femora, attrahendo ex parte sua latus vel strapula, quibus tegitur ager. Si fortis est ager, alius continet pedes et aliter caput dirigat. Ut motus, quantum fieri potest, non collabatur, certa libertas concordanda est aegris; sequantur assistentes agros motus tenendo diagonales partes atque impediendo simul, quominus crines attingantur manu vel parte aliqua dextra. Si vero tot individui non sunt praesto, ulnacula coelestria manentur.

Sed praesto omnes arietes sunt armati et capendum ab oculi reflexione de stato ager, quod cum irritari aut inquietari possit, plerumque oculi tibi cruciati sunt.

## § 28.

Superest de balneo loqui. Hystericus in genere diligit aquas minerales, et subtertium ita utatur, ita, ut plus accuset quam praeiit. Theriac melius conveniat et quidem ferriat et balneo.

Ferrum siccatis interdum atque affectibus, ut supra vidimus, ager quae appetitum contra hystericum nequaquam est collabendum. Ager adhibetur in illis formis, quae promittunt antagonismo, exhaustionem systematicam vasorum vel per haemorrhagias immediatas vel per partum haemorrhum, ad quorum reconstitutionem aeger reperitur magis molis, in

hysteria ergo, quae valides metrorrhagias, partem cum magna sanguine ex utero jactare, leucorrhoeas protractas, et lactationem jactu longiorum inequitat. Indicationes sunt: Thermae Pyramontanae, Buxillae, Brücknae et Thales (partem quidem actus sed multum effluens). Semper actus praeparationis praecedere debet cum reliquis caute, quae in suo fieri supra fuerunt commemorata.

### §. 29.

Sunt vero thermae, quae ferream nequaquam tolerant, sed seductis potius respondent, et quidem illae, quae immediate systematica pugilae invitatione oriantur — thermae potius catholicae. Illae praecipue certa thermarum species conseruit vel artificiales vel naturales. Artificiales eductorem Kallae ex Kali exaltum vel Lithio praeparatas; naturales Thermae Kottmense et aliquae Alpinae Thermae effluens: Castelo et Pfaffers. Interne ad eum effectum promovendum, Narcotici Pulveribus d. r.  $\frac{1}{8}$  —  $\frac{1}{16}$  gr. d. d.; Nucis vom. Extr.  $\frac{1}{12}$  —  $\frac{1}{16}$  gr. d. d. vel Tinct. aliquae guttae d. d.

In acridemortis, plurimum ad ventrem regulando, Thermae ferreae artificiales vel naturales in usum vocantur. Dieta sit stricta, praecipue pophica.

### §. 30.

Ceterum medici per totum totum ventis plerumque expotis, et ab his debentur, vix in thermis nullis et multo circumstantiarum, quae morbum interduci ferunt, praeparatione, deliciis thermarum alia, consuetudine cum hominibus inter ignita, societatem, cura ventium, sanitas, suffragia virorum etc. nulli in genere acriter affecta se sperare licet tam a remedia quam a thermis.

## THESES DEFENDENDÆ.

## I.

Valet polaritatis principium et in physiologia et in pathologia.

## II.

Ritus sexualis in foemina est amor infantum.

## III.

Apparet morbus sub forma vitæ normalis.

## IV.

In nervosis hæmorrhæ percutit quantitate, nonquam qualitate.

## V.

Non datur infarctus glandularum.

## VI.

Podagra hæret in arteriis.

## VII.

Ubi vicia deprimenda, ibi medicina, ubi augenda natura valet.

## VIII.

Stethoscopia dignam firmiorem, prognosin tristicam et therapiam pauperiorem reddit.

## IX.

Libri therapeutici in usum populi conscripsi nonquam utiles.

